

¿Tiene molestias estomacales? Puede ser más grave.

Columbus está sufriendo un brote de Shigella, un microbio que causa una enfermedad diarreica que puede provocar deshidratación y requerir hospitalización.

Se transmite fácilmente y ocurre con más frecuencia entre los niños de entre 2 y 4 años de edad que todavía no han aprendido a ir al baño completamente por sí solos, sus familiares, sus compañeros de juegos y los empleados de las guarderías.



Shigella

Conózcala. Deténgala. Prevéngala.

¿Tiene molestias estomacales? Puede ser más grave.

Columbus está sufriendo un brote de Shigella, un microbio que causa una enfermedad diarreica que puede provocar deshidratación y requerir hospitalización.

Se transmite fácilmente y ocurre con más frecuencia entre los niños de entre 2 y 4 años de edad que todavía no han aprendido a ir al baño completamente por sí solos, sus familiares, sus compañeros de juegos y los empleados de las guarderías.



Shigella

Conózcala. Deténgala. Prevéngala.

¿Tiene molestias estomacales? Puede ser más grave.

Columbus está sufriendo un brote de Shigella, un microbio que causa una enfermedad diarreica que puede provocar deshidratación y requerir hospitalización.

Se transmite fácilmente y ocurre con más frecuencia entre los niños de entre 2 y 4 años de edad que todavía no han aprendido a ir al baño completamente por sí solos, sus familiares, sus compañeros de juegos y los empleados de las guarderías.



Shigella

Conózcala. Deténgala. Prevéngala.

¿Tiene molestias estomacales? Puede ser más grave.

Columbus está sufriendo un brote de Shigella, un microbio que causa una enfermedad diarreica que puede provocar deshidratación y requerir hospitalización.

Se transmite fácilmente y ocurre con más frecuencia entre los niños de entre 2 y 4 años de edad que todavía no han aprendido a ir al baño completamente por sí solos, sus familiares, sus compañeros de juegos y los empleados de las guarderías.



Shigella

Conózcala. Deténgala. Prevéngala.

Lo que necesita saber sobre la Shigella

La Shigella se transmite a través de las heces (popó) de una persona infectada. La transmisión ocurre más frecuentemente cuando alguien no se lava bien las manos después de usar el sanitario, cambiar un pañal o ayudar a un niño a ir al baño.

Lo que puede hacer para detenerla

- Lávese las manos frecuentemente, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales, antes de comer y antes de preparar alimentos o bebidas.
- Ayude a los niños a lavarse las manos después de usar el sanitario.
- Deseche los pañales sucios en un bote cerrado con tapa.
- Desinfecte las zonas donde cambia los pañales cada vez que las utilice.
- No lleve a la guardería a los niños con diarrea.
- Los trabajadores de la industria alimentaria, de la atención médica y de las guarderías que padezcan diarrea deben quedarse en casa y no acudir al trabajo.
- No prepare alimentos para otras personas si está enfermo.
- Si usted o su hijo tienen síntomas, consulte con un médico para que le hagan pruebas y le den un diagnóstico.

Preste atención a los siguientes síntomas

- Diarrea
- Fiebre
- Retortijones estomacales
- Náusea o vómitos



Entérese de más

www.publichealth.columbus.gov o 614-645-1474, opción 2

10/2012

Lo que necesita saber sobre la Shigella


La Shigella se transmite a través de las heces (popó) de una persona infectada. La transmisión ocurre más frecuentemente cuando alguien no se lava bien las manos después de usar el sanitario, cambiar un pañal o ayudar a un niño a ir al baño.

Lo que puede hacer para detenerla

- Lávese las manos frecuentemente, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales, antes de comer y antes de preparar alimentos o bebidas.
- Ayude a los niños a lavarse las manos después de usar el sanitario.
- Deseche los pañales sucios en un bote cerrado con tapa.
- Desinfecte las zonas donde cambia los pañales cada vez que las utilice.
- No lleve a la guardería a los niños con diarrea.
- Los trabajadores de la industria alimentaria, de la atención médica y de las guarderías que padezcan diarrea deben quedarse en casa y no acudir al trabajo.
- No prepare alimentos para otras personas si está enfermo.
- Si usted o su hijo tienen síntomas, consulte con un médico para que le hagan pruebas y le den un diagnóstico.

Preste atención a los siguientes síntomas

- Diarrea
- Fiebre
- Retortijones estomacales
- Náusea o vómitos



Entérese de más

www.publichealth.columbus.gov o 614-645-1474, opción 2

10/2012

Lo que necesita saber sobre la Shigella

La Shigella se transmite a través de las heces (popó) de una persona infectada. La transmisión ocurre más frecuentemente cuando alguien no se lava bien las manos después de usar el sanitario, cambiar un pañal o ayudar a un niño a ir al baño.

Lo que puede hacer para detenerla

- Lávese las manos frecuentemente, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales, antes de comer y antes de preparar alimentos o bebidas.
- Ayude a los niños a lavarse las manos después de usar el sanitario.
- Deseche los pañales sucios en un bote cerrado con tapa.
- Desinfecte las zonas donde cambia los pañales cada vez que las utilice.
- No lleve a la guardería a los niños con diarrea.
- Los trabajadores de la industria alimentaria, de la atención médica y de las guarderías que padezcan diarrea deben quedarse en casa y no acudir al trabajo.
- No prepare alimentos para otras personas si está enfermo.
- Si usted o su hijo tienen síntomas, consulte con un médico para que le hagan pruebas y le den un diagnóstico.

Preste atención a los siguientes síntomas

- Diarrea
- Fiebre
- Retortijones estomacales
- Náusea o vómitos



Entérese de más

www.publichealth.columbus.gov o 614-645-1474, opción 2

10/2012

Lo que necesita saber sobre la Shigella


La Shigella se transmite a través de las heces (popó) de una persona infectada. La transmisión ocurre más frecuentemente cuando alguien no se lava bien las manos después de usar el sanitario, cambiar un pañal o ayudar a un niño a ir al baño.

Lo que puede hacer para detenerla

- Lávese las manos frecuentemente, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales, antes de comer y antes de preparar alimentos o bebidas.
- Ayude a los niños a lavarse las manos después de usar el sanitario.
- Deseche los pañales sucios en un bote cerrado con tapa.
- Desinfecte las zonas donde cambia los pañales cada vez que las utilice.
- No lleve a la guardería a los niños con diarrea.
- Los trabajadores de la industria alimentaria, de la atención médica y de las guarderías que padezcan diarrea deben quedarse en casa y no acudir al trabajo.
- No prepare alimentos para otras personas si está enfermo.
- Si usted o su hijo tienen síntomas, consulte con un médico para que le hagan pruebas y le den un diagnóstico.

Preste atención a los siguientes síntomas

- Diarrea
- Fiebre
- Retortijones estomacales
- Náusea o vómitos



Entérese de más

www.publichealth.columbus.gov o 614-645-1474, opción 2

10/2012